



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

10 НОЯ 2023

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
СЕВАК® АйБерд

(Организация-разработчик: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Company 1107,
Budapest Szallas 5, Hungary/ Сева-Филаксия Ветеринари Биолоджикалз Компани
1107 Будапешт, Сзаллас, 5, Венгрия)

Номер регистрационного удостоверения: 250-1-26.19-4597№ПВИ-1-26.19/05526

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения.
Торговое наименование: СЕВАК® АйБерд (SEVAC® IBird).

Международное непатентованное название: вакцина против инфекционного
бронхита кур живая.

2. Лекарственная форма – лиофилизат для приготовления суспензии для
окулярного/интраназального, перорального применения и спрей-метода.

Вакцина СЕВАК® АйБерд изготовлена из экстраэмбриональной жидкости
СПФ-эмбрионов кур, инфицированных вирусом инфекционного бронхита кур
(вариантный штамм «1/96») с добавлением в качестве стабилизаторов лактозы
моногидрата, сорбитола, сахарозы и желатина, а также калия гидрофосфат и калия
дигидрофосфат.

Одна иммунизирующая доза вакцины содержит не менее $2,8 \log_{10}$ ЭИД₅₀
вируса ИБК (вариантный штамм «1/96»).

3. По внешнему виду вакцина представляет собой лиофилизат желтовато-
белого цвета.

Срок годности вакцины - 18 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий
хранения и транспортирования. После вскрытия флакона вакцину необходимо
использовать в течение 2 часов. По истечении срока годности вакцина к
применению не пригодна.

4. Вакцина расфасована по 2,5 см³ (2500 и 5000 прививных доз) или
по 4 см³ (2500 и 5000 прививных доз) в стеклянные флаконы соответствующей
вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными
алюминиевыми колпачками с пластиковыми крышками.

Флаконы с вакциной упакованы в картонные коробки по 20 штук. В каждую
коробку с вакциной-вкладывают инструкцию по применению вакцины на русском
языке.

5. Вакцину хранят и транспортируют в защищенном от света месте при
температуре от 2 °С до 8 °С.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с
нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом

и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонней примеси, а также остатки вакцины, неиспользованные в течение 2 часов после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут или обработки раствором щелочи 2% или раствором хлорамина 5% (1:1) в течение 30 минут.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата для ветеринарного применения: иммунобиологический лекарственный препарат.

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у птиц к вирусу ИБК через 21 сутки после применения, который сохраняется в течение не менее 6 недель у цыплят бройлеров и не менее 9 недель у цыплят яичного направления, вакцинированных спрей-методом. При совместном применении с вакциной Севак® Mass L спрей-методом иммунный ответ у цыплят-бройлеров и цыплят яичных пород сохраняется в течение 9 недель.

Одна иммунизирующая доза вакцины содержит не менее $2,8 \log_{10}$ ЭИД₅₀ вируса ИБК (вариантный штамм «1/96»).

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. Порядок применения

11. Вакцина предназначена для профилактики ИБК у цыплят-бройлеров, цыплят яичных пород и кур-несушек, в том числе во время яйцекладки, в благополучных, угрожаемых и неблагополучных по данной болезни племенных и товарных хозяйствах различного направления выращивания.

12. Запрещается прививать клинически больную и/или ослабленную птицу.

13. При проведении вакцинации следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты: очками закрытого типа и маской. После работы следует тщательно вымыть и дезинфицировать руки, переодеться. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды. В случае разлива вакцины, зараженный участок пола или почвы заливают раствором хлорамина 5% или едкого натрия.

14. Вакцина безопасна для применения курам-несушкам в период яйцекладки.

15. Вакцину применяют однократно окулярно/интраназально и спрей-методом цыплятам-бройлерам и цыплятам яичных пород в возрасте 1 суток и старше, перорально (выпаивание вакцины с питьевой водой) цыплятам яичных пород, начиная с 10-суточного возраста и старше.

Окулярный/интраназальный метод.

Вакцину разбавляют из расчета 1000 доз на 30 мл стерильной дистиллированной воды. Подготовленную вакцину закапывают глазной пипеткой в носовую щель каждого цыпленка в объеме 0,03 см³ (1 капля), другую при этом закрывают пальцем, чем достигается более глубокое проникновение препарата в носовую полость.

В случае закупорки носовой щели, вакцину в том же объеме наносят на конъюнктиву. Голову цыпленка держат в горизонтальном положении в течение 1-2 секунд.

Спрей-метод.

Для крупнокапельного распыления вакцины используют специальные генераторы (распылители), обеспечивающие образование капель диаметром 150-250 мкм при постоянном давлении 2 бара. Распылители должны быть коррозионно-устойчивы и не содержать остатков дезинфектантов.

Рабочий раствор вакцины готовят непосредственно перед применением, используя чистую питьевую воду, свободную от ионов хлора и железа, из расчета 250-400 мл на 1000 доз в зависимости от возраста птицы. Объем вакцины рассчитывают, исходя из количества, необходимого для работы в течение 1 часа.

При вакцинации суточных цыплят их помещают в ящики, которые плотно устанавливают в один ряд и равномерно распыляют вакцину. Можно использовать специальные спрей-кабины (боксы), оборудованные стационарными распылителями.

При вакцинации цыплят в птичниках необходимо отключить систему вентиляции и обогрева, закрыть вентиляционные отверстия, снизить уровень освещения. Вакцину распыляют над птицей на расстоянии 30-40 см.

Показателем правильно проведенной иммунизации является слегка намокшее оперение птицы.

Через 15 минут после вакцинации следует включить систему вентиляции и отопление, восстановить уровень освещения.

Пероральный метод (выпаивание вакцины с питьевой водой).

Пластиковые поилки, используемые для выпаивания вакцины, тщательно моют без применения дезсредств. Количество поилок должно обеспечивать свободный доступ к вакцине всего иммунизируемого поголовья.

Для приготовления и распределения раствора вакцины используют чистую питьевую воду, свободную от ионов хлора и железа (металлов) с температурой не выше 20 °С и пластиковую посуду.

Объем вакцинного раствора рассчитывают исходя из объема потребления птицей воды в течение 2 часов.

Для стабилизации вакцинного раствора в воду, предназначенную для разведения вакцины, рекомендуется добавить обезжиренное сухое молоко из расчета 2,5 г на 1 л воды или тиосульфат натрия из расчета 15 мг на 1 л воды.

Открыть флакон под водой и выдержать в течение 10 минут, провести вакцинацию. Пустую емкость после распределения вакцины рекомендуется заполнить водным раствором обезжиренного сухого молока в концентрации 2,5 г/л, выдержать в течение 10 минут, открыть систему подачи воды и вымыть остатки вакцинного раствора в систему для поения птиц.

Перед вакцинацией птицу выдерживают без воды в течение 1,5 ч. Поение птицы разрешается через 2 ч после проведения вакцинации.

16. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. У отдельных птиц после вакцинации могут наблюдаться легкие катаральные респираторные симптомы, исчезающие самостоятельно в течение 4-5 суток, в зависимости от состояния здоровья и условий содержания птиц.

17. Симптомов проявления ИБК или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено

18. Вакцина СЕВАК® АйБерд может одновременно применяться в смеси с вакциной СЕВАК® Mass L цыплятам суточного возраста и старше спрей-методом.

Запрещено использовать дезинфектанты за 48 часов до и в течение 24 часов после вакцинации. Не использовать воду, содержащую высокую концентрацию ионов металлов.

19. В связи с особенностями эпизоотологии ИБК (вакцинированные цыплята могут выделять вирусный штамм в течение 28 суток после вакцинации) следует не допускать контакта привитого поголовья и не вакцинированных птиц (особенно не вакцинированных кур-несушек). Птицы, содержащиеся в одном помещении, должны быть вакцинированы одновременно.

20. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики ИБК. В случае пропуска введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

21. Продукты убоя, мясо и яйцо от вакцинированных птиц реализуют без ограничений.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата
для ветеринарного применения.

1. Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Company, 1107, Budapest Szallas 5, Hungary/ Сева-Филаксия Ветеринари Биолоджиалз Компани 1107 Будапешт, Сзаллас, 5, Венгрия (производство, контроль качества, первичная и вторичная упаковка, выпуск серии).

2. Ceva Sante Animale 10 avenue de la Ballastiere, 33500, Libourne, France/Сева Санте Анималь, 10 авеню де ла Балластьер, 33500, Либурн, Франция (вторичная упаковка).

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя

ООО «Сева Санте Анималь»,
109428, Россия, г. Москва, Рязанский
проспект, д. 16, тел.: (495) 729-59-90.

Представитель компании
«Сева Санте Анималь»



Н.Н. Сомова